

La **Unidad de Ginecología Oncológica y Patología Mamaria** ofrece un tratamiento multidisciplinar y específico para las necesidades de cada mujer, en la patología de cáncer ginecológico y de mama.

Entendiendo los miedos e incertidumbres que el diagnóstico de un cáncer conlleva, es fundamental una rápida respuesta, y un tratamiento individualizado, con especialistas especialmente entrenados.

La Unidad de Ginecología Oncológica y Patología Mamaria de Hospiten Rambla comparte los protocolos médicos con **MD Anderson Cancer Center Madrid**.

¿Qué es cáncer ginecológico?

El cáncer ginecológico afecta a los órganos reproductivos de la mujer, incluyendo cérvix, útero, ovarios, trompas de Falopio y vulva. La detección temprana es fundamental para aumentar las posibilidades de curación.

HOSPITEN RAMBLA
Rambla de Santa Cruz, 115
38001 Santa Cruz de Tenerife - TENERIFE
T +34 922 291 600 - F +34 922 291 088
T Consultas +34 922 534 240
rambla@hospiten.com

MD ANDERSON CANCER CENTER MADRID
C/Arturo Soria, 270
28033 Madrid
T +34 91 277 72 20 - F +34 91 768 06 87
info@mdanderson.es

hospiten 

www.hospiten.com



hospiten 

**Unidad de
Ginecología Oncológica
y Patología Mamaria**



CÁNCER DE MAMA

Los síntomas del cáncer de mama pueden variar de una mujer a otra. Las mujeres deben conocerse las mamas para saber lo que sienten y parece normal para ellas. Los cambios han de notificarse inmediatamente a un profesional sanitario.

Muchos cánceres se detectan mediante una mamografía sistemática después de los 40 años, antes de notar ningún síntoma.

Entre los síntomas figuran:

- Bulto o masa en la mama.
- Aumento del tamaño de los ganglios linfáticos (adenopatías) en la axila.
- Cambios en el tamaño, forma, textura de la piel o color de la mama.
- Enrojecimiento de la piel.
- Formación de depresiones o arrugas.
- Cambios o secreción por el pezón.
- Descamación.
- Tracción del pezón hacia un lado o cambio de dirección.

Muchos cambios en las mamas, incluso bultos, no son cáncer; no obstante, si observa uno o más de estos síntomas durante más de dos semanas, consulte a su médico.

**Servicio de Ginecología
y Obstetricia**

CÁNCER DE CÉRVIX

La mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino se deben a una infección por el virus del papiloma humano (VPH).

El cáncer de cuello uterino es sumamente prevenible. La citología es un método de screening que, no sólo detectan células cancerosas, sino también alteraciones en el cuello uterino que, con el tiempo, pueden progresar a cáncer, lo que conocemos como displasia.


Hay dos tipos principales de cáncer de cuello uterino:

1. El carcinoma epidermoide (80-90%) se desarrolla en el revestimiento del cuello uterino.
2. El adenocarcinoma (10-20%) se desarrolla en las células de las glándulas productoras de moco cervical.

SÍNTOMAS:

En sus estadios iniciales, el cáncer de cuello uterino no suele provocar síntomas, motivo por el que son tan importantes las citologías cervicales regulares, especialmente en las mujeres sexualmente activas. Informe al médico inmediatamente si experimenta alguno de los siguientes síntomas:

- Flujo vaginal teñido de sangre.
- Hemorragia después de mantener relaciones sexuales.
- Hemorragia anormal: después de la menopausia, entre menstruaciones o menstruaciones excesivamente profusas.
- Aumento de la frecuencia urinaria.
- Dolor.
- Hinchazón de una pierna (observado en casos más avanzados).



FACTORES DE RIESGO:

- **Edad:** el riesgo de cáncer de cuello uterino aumenta con la edad y se diagnostica con mayor frecuencia en mujeres mayores de 40 años.
- **Tabaquismo:** Aumenta el riesgo de presentar cambios precancerosos en el cuello uterino, especialmente en las mujeres con VPH (virus papiloma humano).
- **Conducta sexual:** determinados tipos de actividades sexuales pueden incrementar el riesgo de infectarse por el VPH, como el hecho de tener múltiples parejas sexuales o parejas masculinas de alto riesgo, el mantenimiento de la primera relación sexual a una edad temprana y el uso de métodos anticonceptivos que no sean de barrera.
- **Ausencia de citologías cervicales regulares:** el cáncer de cuello uterino es más frecuente en las mujeres que no se someten a cribados previos mediante citología, la cual ayuda a identificar células precancerosas.
- **Enfermedades de transmisión sexual (ETS).**
- Exposición a **dietilestilbestrol (DES)** antes del nacimiento
- Infección por el **VIH.**
- **Sistema inmunitario debilitado:** las mujeres que se han sometido a un trasplante de órgano o que toman esteroides por otros motivos corren un riesgo mayor que la media de padecer un cáncer de cuello uterino.

CÁNCER DE ENDOMETRIO

El cáncer de útero es el cáncer más frecuente del aparato reproductor femenino. Más del 95% de casos de cáncer de útero será un cáncer de endometrio, que afecta al revestimiento del útero (endometrio).

La mayoría de los cánceres de útero se desarrollan durante varios años y pueden surgir a partir de lesiones precancerosas como la hiperplasia endometrial. La mayoría se producen en mujeres posmenopáusicas. Afortunadamente, la mayoría de los cánceres de útero se descubren de forma precoz debido a la aparición de signos de alarma, como hemorragia irregular o post-menopáusica. El conocimiento de estos síntomas es importante para las mujeres y los médicos.

SÍNTOMAS:

Los cánceres de ovario, cuello uterino y útero tienen síntomas similares. Si observa una hemorragia vaginal posmenopáusica o uno o más de los síntomas siguientes durante más de dos semanas, consulte a su médico, sobre todo si es una mujer posmenopáusica.

- Hemorragia pre o perimenopáusica.
- Flujo vaginal anormal.
- Dolor o presión pélvica, de aparición habitual en las fases más avanzadas de la enfermedad.
- Pérdida de peso.

CÁNCER DE OVARIO

La incidencia del cáncer de ovario es de aproximadamente 5 casos por cada 100.000 habitantes. Los síntomas suelen ser comunes y vagos, como indigestión, aumento de peso o las consecuencias del envejecimiento, lo que dificulta el diagnóstico. Póngase en contacto con su médico si presenta alguno de los síntomas siguientes:

- Dolor o molestias abdominales generales (gases, indigestión, presión, hinchazón, calambres).
- Sensación de plenitud, incluso después de una comida ligera.
- Náuseas, diarrea, estreñimiento o micción frecuente.
- Pérdida o aumento de peso inexplicado.
- Pérdida de apetito.
- Hemorragia vaginal anómala.
- Cansancio inusual.

La investigación en Oncología es constante y fundamental y, gracias a ello, se han alcanzado grandes avances en el tratamiento del cáncer en los últimos años.

La prevención y las revisiones ginecológicas son el método más eficaz de detección precoz del cáncer de ovario.